

Rédaction le 11 mars 2020.

Dernière mise à jour le 11
mars 2020

Lien vers l'article:

[https://infosante.whitecube.
dev/guides/allergie-au-latex](https://infosante.whitecube.dev/guides/allergie-au-latex)



De quoi s'agit-il ?

L'allergie au latex est une **réaction allergique** qui se produit après le contact avec des produits contenant du latex, par exemple des gants en caoutchouc, des préservatifs, des ballons, des poupées souples et des objets en caoutchouc. Il est important de signaler cette allergie aux professionnels de santé qui s'occupent de vous, par exemple **si vous devez être opéré**.

Chez qui et à quelle fréquence ?

L'allergie au latex touche **1 personne sur 1 000**. Ce problème survient beaucoup plus souvent chez les professionnels de la santé (jusqu'à 1 personne pour 10). L'allergie au latex est plus fréquente chez les personnes souffrant déjà d'autres allergies, comme les allergies alimentaires (principalement les fruits et les légumes) et l'eczéma des mains. **Les autres groupes à risque** sont les personnes qui portent souvent des gants de nettoyage et celles qui ont subi plusieurs interventions (par exemple pour le spina bifida), en particulier pendant leur enfance.

Comment la reconnaître ?

La réaction allergique est déclenchée **par contact direct avec du latex** sur la peau ou les muqueuses. Les symptômes les plus fréquents sont les démangeaisons, l'eczéma des mains, les yeux qui pleurent, le nez qui coule et l'essoufflement. Bien que rare, la situation peut être mortelle.

Comment le diagnostic est-il posé ?

Le diagnostic est posé après **un test d'allergie cutané** (prick-test). Il s'agit du meilleur test pour diagnostiquer l'affection. **Une analyse de sang** est aussi réalisée. Les tests d'exposition se font à l'hôpital dans un environnement contrôlé.

Que pouvez-vous faire ?

Il est indiqué **d'éviter autant que possible les contacts** avec des produits contenant du latex. Les professionnels de la santé et leurs collègues directs

doivent porter des gants spécifiquement adaptés.

Que peut faire votre médecin ?

En présence de symptômes, le médecin prescrira **un antihistaminique**. En cas d'eczéma, **une crème à base de cortisone** peut calmer les démangeaisons.

Rédaction le 11 mars 2020.

Dernière mise à jour le 11 mars 2020

Lien vers l'article:

<https://infosante.whitecube.dev/guides/allergie-au-latex>



Liens Utiles

- Bilan allergologique (patch tests ou prick tests), ici, <https://www.saintluc.be/brochures-information-patients/brochures/commu-dsq-170-bilan-allergologique.pdf>
- Antihistaminiques <https://www.cbip.be/fr/chapters/13?frag=12336>
- Corticostéroïdes pour la peau <https://www.cbip.be/fr/chapters/16?frag=14233>
- Le test d'allergie cutané expliqué aux enfants et en images <https://www.sparadrap.org/enfants/dictionnaire/les-examens-les-soins/test-dallergie>

Sources

- Guide de pratique clinique étranger <https://www.ebpnet.be/fr/pages/display.aspx?ebmid=ebm00298>